

कृषि मौसम विज्ञान विभाग
न०दे० कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।

बीते सप्ताह में मौसम का विवरण								
दिनांक	बादलों की स्थिति	वर्षा (मि०मी०)	हवा की गति (कि०मी०/घं०)	हवा की दिशा	सापेक्षिक आर्द्रता (%)		विगत सप्ताह का औसत तापमान (%)	
					अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
०५.०३.१६-०९.०३.१६	आसमान साफ / हल्के बादल	वर्षा नहीं	सामान्य / सामान्य से तेज	उत्तरी-पश्चिमी, दक्षिणी-पश्चिमी	८५	३५	३२.५	१४.३

आगामी सप्ताह में मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह								
दिनांक	बादलों की स्थिति	वर्षा (मि०मी०)	हवा की गति (कि०मी०/घं०)	हवा की दिशा	सापेक्षिक आर्द्रता (%)		आगामी सप्ताह का तापमान (%)	
					अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
०९.०३.१६	हल्के बादल	वर्षा नहीं	सामान्य	दक्षिणी-पश्चिमी	६४	४५	३५	१५
१०.०३.१६	हल्के बादल	वर्षा नहीं	सामान्य	पूर्वी-दक्षिणी-पूर्वी	६०	४३	३६	१७
११.०३.१६	आसमान साफ	वर्षा नहीं	सामान्य	दक्षिणी-पश्चिमी	५७	३९	३६	१७
१२.०३.१६	हल्के बादल	वर्षा नहीं	सामान्य	दक्षिणी-पश्चिमी	६८	४६	३७	१८
१३.०३.१६	मध्यम से घने बादल	वर्षा नहीं	सामान्य	दक्षिणी	७५	५३	३४	२०

- आगामी सप्ताह में हल्के बादल छाये रहने तथा हवा के तेज रहने की सम्भावना को देखते हुए किसान भाई गेहूँ की सिंचाई न करें यदि आवश्यक हो तो सायंकाल में हवा शान्त होने पर ही सिंचाई करें।
- किसान भाई जायद की सब्जियाँ जैसे—भिण्डी, लौकी, तोरई, करेला, लोबिया तथा खीरावर्गीय फसलों की बुवाई उचित नमी की दशा में शीघ्रतिशीघ्र करें।
- प्याज व शैगन में यदि धब्बा रोग नजर आये या थिप कीट लगा हो तो संस्तुति अनुसार छिड़काव करें।
- परवल की बेल के नीचे खेत में धान के पुवाल की ३-४ इंच मोटी परत बिछाये इससे खरपतवार की रोकथाम हो जाती है। यदि खेत में ज्यादा खरपतवार हों तो उन्हें निकालकर खेत को साफ कर दें।
- किसान भाई उचित नमी की दशा में खाली पड़े खेतों में उर्द एवं मूंग की बुवाई शीघ्रतिशीघ्र करें इसके लिए उर्द की टा० ९ अथवा पंत यू० १९, और मूंग की पूसा वैशाखी, नरेन्द्र मूंग १, टा० ४४ एवं पंत मूंग १२ में से किसी एक का चयन कर २०-२५ किगा० बीज प्रति हे० की दर से बुवाई करें।
- लीची, पपीता, अमरूद तथा अन्य फसलों में खाद एवं उर्बरकों का प्रयोग संस्तुति अनुसार उचित नमी की अवस्था में शीघ्र करें।
- आम, आंवला एवं अमरूद के नये बागों में मिर्च, भिण्डी एवं लोबिया का अन्न-शस्यन करें।
- आम में खुर्रा रोग दिखाई पड़ने पर घुलनशील गंधक ०.२ प्रतिशत (२ ग्राम प्रति ली०) या ट्राइडोमार्फ ०.२ प्रतिशत (१ मिली० प्रति ली०) पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- आम के बौर को रूके रहने के लिए घुलनशील गंधक का २ ग्राम प्रति ली० पानी के हिसाब से आम के बौर पर छिड़काव करें।
- मछलियों को उनके भार का १-२ प्रतिशत पूरक आहार (सरसों की खली, चावल का कना) प्रतिदिन देना चाहिए।
- १० किगा० यूरिया व २५ किगा० सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हे० की दर से प्रति माह प्रयोग करना चाहिए।
- गोबर की खाद व रासायनिक उर्बरकों के मध्य १५ दिन का अन्तर रखें।

Ambyl
(Dr. A.K. Singh)

Dr. Sanilk
10/3/14